



Corso dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Torino

A cura della Commissione Solidarietà Nazionale e Internazionale Equità
dell'accesso alle cure dell'OMCeO di Torino,
in collaborazione con il Comitato Collaborazione Medica



7 novembre 2017 | Villa Raby Corso Francia, 8 Torino

I VACCINI TRA SCIENZA E FALSI MITI

**Fakenews sui vaccini:
come nascono e come si contrastano**

Vittorina Buttafuoco e
Luisa Mondo

Le domande dei genitori



La storia dei movimenti antivaccinali, che si sono opposti ai vaccini per ragioni sanitarie, religiose e politiche, è una storia antica quanto la pratica stessa dell'inoculazione del vaiolo (fine 1700)

Vaccination Act del 1840: vaccinazioni gratuite per i poveri e vieta la precedente pratica della variolizzazione.

Dal 1853 la vaccinazione diventa obbligatoria per legge per i bambini dai 3 mesi di vita con pena pecuniaria a carico degli obiettori



The Cow-Pock — or — the Wonderful Effects of the New Inoculation! — Vide. the Publications of the Anti-Vaccine Society.

1802 James Gillray

ma non si sovraccarica il sistema immunitario ????

i vaccini
stimolano e
rafforzano il
sistema
immunitario

chi non si vaccina può
contrarre, per
esempio, il morbillo,
che provoca una
prolungata e
pericolosa
soppressione delle
difese, tale da
aumentare in maniera
rilevante la mortalità
per altre malattie
negli anni che
seguono all'infezione

i vaccini vengono somministrati troppo presto

i tempi delle vaccinazioni sono messi a punto sulla base di studi molto ampi in modo da garantire la massima sicurezza e la più alta protezione possibile

pertosse ed emofilo B sono pericolosi nella prima infanzia: ritardando la vaccinazione si rischia inutilmente

dieci vaccini sono troppi e vengono fatti solo in Italia

i 10 vaccini vengono somministrati sostanzialmente con le stesse tempistiche e con le stesse modalità in tutti i Paesi

in Italia le coperture sono basse ed si è scelto di correre ai ripari

i vaccini hanno gravi effetti collaterali

l'incidenza di gravi effetti
collaterali è minima (meno di
un
caso su un milione)

hanno un rapporto
rischio-beneficio
estremamente
favorevole:
i potenziali danni da
vaccino sono inferiori
rispetto alle possibili delle
malattie

Si calcola che, nel mondo,
i vaccini salvino,
ogni minuto,
5 vite
ossia 7200 al giorno
cioè 25 milioni tra
il 2011 e il 2020

perché non vengono somministrati separatamente?

i vaccini singoli espongono il soggetto ad una dose maggiore di adiuvanti

più vaccini assieme migliorano la risposta immunitaria (effetto sinergico)

i vaccini sono un grande affare per le case farmaceutiche

nel 2015 tutti i vaccini in Italia hanno fatturato 318 milioni di euro, pari all'1,4% della spesa farmaceutica

ogni euro speso in vaccini ne fa risparmiare almeno trenta in cure

l'antipatite B si fa ai neonati a causa di De Lorenzo

si tratta di un virus molto forte e resistente nell'ambiente esterno

sono stati registrati casi di inaspettata e inapparente trasmissione tramite oggetti contaminati ai bambini della famiglia, da parte di adulti inconsapevoli di aver contratto l'infezione magari in modo asintomatico

chi è vaccinato diventa infettivo

la maggior parte dei vaccini è costituita da singoli componenti virali e batterici

altri vaccini contengono virus in grado di replicarsi, ma non in grado di infettare altri individui

i vaccinati contro la varicella possono trasmettere il virus (in tutto il mondo sono stati riportati solo nove casi di trasmissione da vaccinati in 30 anni)

ci vanno gli esami prevaccinali (adversomica)

il legame tra genetica ed effetti avversi ai vaccini rappresenta un interessante e promettente campo di ricerca, ma non è ancora in grado di dare indicazioni cliniche: non esistono test affidabili sulla predisposizione del bambino alle intolleranze ai vaccini

è esiguo il numero di soggetti studiati (estrema rarità di effetti avversi registrati)

la complessità della risposta immunitaria, la varietà genetica etnica e le interazioni tra geni rendono estremamente complicata l'individuazione di trend e correlazioni, soprattutto se i risultati devono essere sottoposti a una rigorosa valutazione statistica

un esame del sangue o delle urine, un'analisi dei tessuti, una caratterizzazione del metabolismo o qualunque altro test, non possono predire la reazione alla somministrazione del vaccino

fanno firmare un foglio e scaricano tutte le responsabilità

Legge 210 del 1992: si parla di indennizzo e non di risarcimenti. L'indennizzo è una misura di solidarietà sociale mentre il risarcimento ha come presupposto l'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa

il consenso serve solo a testimoniare che il genitore è stato informato su che cosa si sta per iniettare al bambino, non serve a scaricare il medico e le istituzioni dalle responsabilità

e l'autismo???

tutto nasce da una della più tragiche "bufale" scientifiche: Andrew Jeremy Wakefield nel 1997 pubblicò su Lancet un articolo in cui parlava di anticorpi anti-morbillo nell'intestino di 12 bambini autistici. Purtroppo lo studio non era autorizzato; dei 12 bimbi, 3 non erano autistici, 5 lo erano prima della vaccinazione....13 anni dopo l'articolo è stato ritirato e smentito, ma il danno era fatto

l'incidenza di autismo è identica nei bambini vaccinati e non, come dimostrano studi effettuati anche su individui a rischio (per esempio fratelli di bambini autistici).

diffidenza

procurato allarme



Prima del vaccino. Fai un video al tuo bambino.

Entro i 6 anni di vita ad un bambino vengono inoculati un quantitativo esorbitante di vaccini.

Anti-difterica: 4 dosi
Anti-poliomielite: 4 dosi
Anti-tetanica: 4 dosi
Anti-epatite virale B: 3 dosi
Anti-pertosse: 4 dosi
Anti-Haemophilus influenzae: 3 dosi
Anti-meningococcica B: 4 dosi
Anti-rotavirus: 3 dosi
Anti-pneumococcica: 3 dosi
Anti-meningococcica C: 1 dose
Anti-varicella: 2 dose
Anti-morbillo: 2 dose
Anti-parotite: 2 dose
Anti-rosolia: 2 dose

**PER UN TOTALE DI
41 DOSI VACCINALI**

Quando fai vaccinare tuo figlio
RICORDATI DI:



- Farti rilasciare prima del vaccino un certificato di sana costituzione da un pediatra.



- Fare dei video al tuo bambino prima del vaccino dove si veda che parla, corre, gioca, si muove in modo autonomo e coordinato.



- Farti timbrare il libretto vaccinale. Fai apporre data, firma, tipo di vaccino inoculato e numero di serie.



- Dopo il vaccino nel caso di affetti avversi, prendi nota di tutto e documenta con ulteriori video dai quali si evinca il danno provocato e la data.

E se le cinture di sicurezza fossero la causa del cancro?

Inserito da **Redazione SI** on 30 aprile 2013 – 14:26

4 commenti



Pier Luigi Lopalco

Sul perché le bufale sono così dure da smontare. A causa della bufala "vaccazione antimorbillosa-autismo", ancora oggi ci troviamo nella necessità di impegnare ingenti risorse per contenere epidemie di morbillo evitabili e ad affrontare i costi di studi epidemiologici altrettanto evitabili.

È degli ultimi giorni la notizia che nuove epidemie di morbillo stanno creando serie preoccupazioni nel Regno Unito: il numero di casi registrati nella sola area di Swansea nel Galles sfiora il migliaio.

Circa 80 casi gravi ed un probabile decesso^[1]. Il Regno Unito si trova a pagare, a quasi vent'anni di distanza, il prezzo del cosiddetto "affare Wakefield" (leggi qui [MMR e autismo. La truffa svelata](#) e [MMR e autismo. La frode. Atto secondo](#)) una brutta storia di una frode scientifica che ha avuto un serissimo impatto sulla sanità pubblica e di cui si è a lungo discusso su questo blog in precedenza. Intanto, sempre nello stesso periodo, vengono pubblicati i risultati di un ulteriore studio, fatto dai *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) americani, in cui si ribadisce l'assenza di correlazione fra autismo e vaccinazioni dell'infanzia^[2]. Questi due fatti, avvenuti in rapida successione, mi suggeriscono alcune riflessioni.

Immaginate che un bel giorno una prestigiosa rivista scientifica (mettiamo *The Lancet*) pubblichi i risultati di una ricerca in cui gli autori alla fine dichiarano: "Benché il nostro studio non fornisca prove dirette, l'uso di cinture di sicurezza potrebbe essere associato ad un aumentato rischio di tumore al polmone. Se questo fosse vero si dovrebbe osservare un aumento di tumore al polmone dopo l'introduzione dell'obbligo di usare le cinture, ma i dati tuttora disponibili non permettono di verificare questo aumento".

A questo punto la notizia viene ripresa da un paio di riviste molto popolari e da quel momento in TV non si fa che parlare d'altro. Si creano subito due fazioni: da una parte le associazioni delle vittime degli incidenti stradali che insorgono contro questa ipotesi, dall'altra numerose organizzazioni che rivendicano la libertà di scelta e accusano il governo di essere in combutta con i produttori di cinture di sicurezza.

<http://www.saluteinternazionale.info/2013/04/e-se-le-cinture-di-sicurezza-fossero-la-causa-del-cancro/>

MMR e autismo. La truffa svelata

Inserito da **Redazione SI** on 20 settembre 2010 – 07:44

38 commenti

Guendalina Allodi



Dodici anni fa un articolo di *Lancet* metteva in relazione la vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia con l'insorgenza di autismo. Si è scoperto che era una truffa. Ma intanto nel Regno Unito le vaccinazioni sono crollate.

Nel 1998 Andrew Wakefield, gastroenterologo britannico, pubblicò su *Lancet* un articolo^[1] in cui analizzava la correlazione tra vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia), la malattia infiammatoria intestinale e autismo sulla base in uno studio condotto su 12 bambini ricoverati al Royal Free Hospital di Londra.

Fu l'inizio di un clamore mediatico impressionante per vari motivi: la notizia veniva riportata da una delle riviste mediche più autorevoli, riguardava una malattia diffusa e dalle cause poco note e concerneva vaccinazioni cui sono sottoposti ogni anno milioni di bambini. L'articolo non sosteneva tuttavia che il vaccino fosse direttamente responsabile dell'autismo, **dichiarava espressamente che non era stato dimostrato un legame tra la vaccinazione ed i sintomi della malattia e sottolineava che erano necessari altri approfondimenti.**

Fu Wakefield in persona, all'epoca medico al Royal Free Hospital, a gonfiare il rischio organizzando una conferenza stampa in cui **dichiarò che il legame autismo-vaccino era probabile ed in cui mise in guardia i genitori consigliando loro di sospendere la tradizionale vaccinazione trivalente in favore di formulazioni singole**, cioè separate per ogni patologia, di fatto non esistenti in commercio.

Nonostante all'epoca risultasse privo di fondamento il legame tra autismo e MMR^[2], i media propagarono la notizia in maniera sorprendente ed esponenziale e l'effetto fu davvero devastante; ne nacque una campagna mediatica che dall'Inghilterra in poco tempo si diffuse in tutto il mondo accusando le ditte farmaceutiche ed il governo inglese di sottostimare i pericoli legati alle vaccinazioni. Poco tempo dopo, un altro studio contribuì a gettare benzina sul fuoco, sostenendo che fosse il **Thiomersal**, componente dei vaccini multidoso, la causa della sindrome autistica.

Lo studio di Wakefield accese nell'opinione pubblica un corteo di paure nei riguardi del vaccino trivalente^[3] e, più in generale, una ripresa del movimento anti-vaccinazioni, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra. Nell'intero Regno Unito le percentuali dei bambini vaccinati scesero dal 93% al 75% e solo a Londra crollarono al 50%. Le conseguenze non si fecero attendere e furono terribili: dai 56 casi di morbillo del 1998, in Gran Bretagna e Galles si arrivò ai 1348 del 2008 con

<http://www.saluteinternazionale.info/2010/09/mmr-e-autismo-la-truffa-svelata/>

MMR e autismo. La frode. Atto secondo

Inserito da **Redazione SI** on 24 settembre 2012 – 00:09

27 commenti

<http://www.saluteinternazionale.info/2012/09/mmr-e-autismo-la-frode-atto-secondo/?pdf=7781>

Guendalina Allodi



La frode sulla base della quale si era ipotizzato un legame tra vaccinazione contro il morbillo e autismo si arricchisce di nuovi documenti. Il quadro che ne esce è davvero sconvolgente: non si tratta di una "semplice" falsificazione scientifica (già gravissima per le conseguenze di sanità pubblica e per l'allarme sociale che ha prodotto), è anche una frode scientifica costruita ad arte all'interno di un losco piano scientifico-affaristico. Alla quale sembra non credere un giudice di Rimini.

La sentenza di Rimini

Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 15 Marzo 2012 (vedi **Risorsa**), ha condannato il Ministero della salute al risarcimento per il danno subito da un minore a causa di una vaccinazione.

Il danno è un "disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio", la vaccinazione quella fatta con il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (comunemente MMR – *Measles, Mumps and Rubella*). La relazione causale tra i due eventi è sostenuta – secondo il giudice – da "una ragionevole probabilità scientifica".

Il precedente

Nel settembre 2010 abbiamo pubblicato un post dal titolo "**MMR e autismo. La truffa svelata**".

In breve la storia è questa.

Nel febbraio 1998 la rivista *Lancet* pubblica un *paper*, a firma di Andrew Wakefield e altri 10 autori, nel quale si sostiene la relazione tra MMR e una "nuova sindrome" costituita da autismo e un'imprescindibile malattia intestinale^[1].

L'uscita dell'articolo – adeguatamente pubblicizzato – ha un immediato impatto sull'opinione pubblica inglese: produce un'alta diffidenza verso questa vaccinazione, un rapido calo nella copertura vaccinale dei bambini e dopo un po' di tempo la ricomparsa di casi di morbillo. Nel 2006 – dopo 14 anni – si verifica un nuovo caso mortale di morbillo.

Ancora su Magistratura e vaccini...

Inserito da [Redazione SI](#) on 15 dicembre 2014 – 09:40

[2 commenti](#)

<http://www.saluteinternazionale.info/2014/12/ancora-su-magistratura-e-vaccini/>



Massimo Valsecchi

Una nuova sentenza amplia la tipologia di vaccini che alcuni magistrati ritengono responsabili della sindrome autistica : dallo "storico" MMR al "nuovo" esavalente. È evidente la tendenza di alcuni magistrati di scegliere periti che abbiano già manifestato uno specifico orientamento sul tema specifico e non per la loro competenza tecnica.

A fine novembre (notizia riportata dalla stampa nazionale il 25) il Tribunale del Lavoro di Milano (Giudice Nicola De Leo) ha firmato una sentenza che condanna il Ministero della Salute a versare un vitalizio ad un bambino autistico dato che **"sarebbe acclarata la sussistenza di un**

nesso causale fra tale vaccinazione (una vaccinazione eseguita nel 2006 con vaccino esavalente) e la malattia".

Prima di rivolgersi al giudice i genitori del bambino , che ha nove anni e a cui l'autismo è stato diagnosticato nel 2010, avevano presentato, nel 2011, al Ministero della Salute, una domanda di indennizzo che era stata respinta.

Questo nuova sentenza della Magistratura del lavoro sulla relazione fra vaccinazioni ed autismo mi induce a riprendere le fila del mio intervento precedente su questo tema ([Magistratura e salute. La credibilità perduta](#), Salute internazionale. 9 giugno 2014)

Questa sentenza, infatti, amplia la tipologia di vaccini che alcuni magistrati ritengono responsabili della sindrome autistica : dallo "storico" MMR al "nuovo" esavalente" e dilata la breccia già difficilmente sanabile fra chi si occupa di salute e chi si occupa di giustizia in questo Paese.

e i contaminanti ????

i sali di alluminio non sono eliminabili dai vaccini che attualmente li contengono, perché giocano un ruolo fondamentale nella risposta immunitaria: il contenuto di alluminio nei vaccini è dell'ordine di alcuni mg
L'OMS afferma che nella popolazione generale non esiste alcun rischio sanitario in relazione all'assunzione di alluminio con i farmaci e con l'alimentazione

l'apporto di mercurio con i vaccini è dell'ordine di un centesimo di microgrammo, almeno 1000 **volte inferiore** alla dose giornaliera cronica (acqua, cibo, aria) per la quale non si evidenziano effetti per la salute



nel sangue di un bambino, la formaldeide ha naturalmente una concentrazione di 4 volte maggiore rispetto a quella contenuta in un vaccino

DOSE MINIMA TOSSICA GIORNALIERA:
125 mg per chilo di peso

FORMALDEIDE ASSUNTA CON I VACCINI:
0,2-0,3 mg



alcuni vaccini (non tutti) contengono residui di formaldeide (circa 0,005-0,1 mg)

un bambino di 2 mesi che pesa 5 kg possiede 1,1-1,2 mg totali di formaldeide nel sangue, frutto di alcune reazioni del nostro organismo

il corpo produce una quantità di formaldeide 100 volte inferiore al livello minimo pericoloso

È LA DOSE A FARE IL VELENO!

Siti di cui fidarsi

- Prof. [Pier Luigi Lopalco, epidemiologo](https://goo.gl/3qKBWi) - <https://goo.gl/3qKBWi>
- Prof. [Silvestri & Cossarizza, Medici & Scienziati](https://goo.gl/MmauWJ) - <https://goo.gl/MmauWJ>
- Prof. [Roberto Burioni, Medico](https://goo.gl/sVu9pb) - <https://goo.gl/sVu9pb>
- Dott. [Salvo Di Grazia](https://goo.gl/Lb5Sjr) - <https://goo.gl/Lb5Sjr>
- Prof. [Nino Cartabellotta](https://goo.gl/NMNPBh) - <https://goo.gl/NMNPBh>
- [BUTAC - Bufale un tanto al chilo](http://www.butac.it) - www.butac.it
- [IoVaccino](http://www.iovaccino.it) - www.iovaccino.it
- [VaccinarSi](http://vaccinarsi.blogspot.it) - <http://vaccinarsi.blogspot.it>
- [VaccinarSi](http://www.vaccinarsi.org) - www.vaccinarsi.org
- [Rete Informazione Vaccini - RIV](http://www.riv.life) - www.riv.life
- Fondazione GIMBE - <http://www.gimbe.org>
- MedBunker - <http://medbunker.blogspot.it>
- FIMP Prevenzione - www.fimp.pro
- CICAP - www.cicap.org
- http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/GuidaVaccini_ott2015.pdf
- www.valigiablu.it/vademecumvaccini/

www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/GuidaVaccini_ott2015.pdf

#IoVaccino

Guida intergalattica
per genitori dubbiosi

Siti fake

- Alleanza della salute
- AsSIS.it
- Autismovaccini.org
- Comilva
- EuroSalus
- InformaSalus
- La Fucina
- La nuova medicina germanica
- Mamma In rete
- Medicinenon .it
- MedNat.org
- VacciniInforma
- Vivoinsalute.com



IO SONO UN
MORTO
DA VACCINO
DI CUI NON
VERRAI MAI
A CONOSCENZA
RINNEGATO
E DIMENTICATO



#IONONDIMENTICO



corvelva.it/emiliano-rapposelli

Terrorismo psicologico

L'obiezione

21 agosto 2017

VACCINI: ISTANZA IN CASO DI INVITO AL CENTRO VACCINALE

Che fare, in caso di convocazione del bambino al centro vaccini ma in assenza delle indagini pre-vaccinali richieste? È, questa, una delle principali preoccupazioni dei genitori: dopo che l'Associazione ha messo a disposizione di tutti gli interessati **il modulo** da inviare alle singole ASL e all'Agenzia Italiana del farmaco, così da prevedere ogni indagine pre-vaccinale e tutelare in ogni modo possibile i piccoli sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge, può comunque arrivare la convocazione del centro vaccinale (anche in mancanza degli esami citati).


Proprio per questo motivo, l'Associazione ha scelto di completare il lavoro avviato in precedenza e di mettere a disposizione di tutti i cittadini interessati un modello di istanza da presentare alla Asl e al pediatra in caso di convocazione per la vaccinazione.

Il principio portato avanti dal Codacons, infatti, è molto chiaro: nessuno può essere vaccinato se non si sono prima compiuti gli esami medici necessari per escludere pericoli alla salute del bambino. In assenza degli esiti di tali indagini, quindi, diventa necessario fissare altra data presso il centro vaccinale al fine di poter adeguatamente sottoscrivere il modulo del consenso informato.

L'istanza è scaricabile gratuitamente **cliccando qui**: per farlo è necessario compilare il form con i propri dati, che saranno utilizzati solo per i fini statuari del Codacons finalizzati alla libertà di vaccinazione.

<https://codacons.it/vaccini-istanza-ricevuto-invito-al-centro-vaccinale/>

«Sarebbe auspicabile che il confronto con gli attivisti antivaccinali non si basasse su dati empirici, ma piuttosto su una **dimensione narrativa ed emotiva** che tenesse conto delle distorsioni nella capacità di giudizio suggeriti dalle neuroscienze»





Grazie per l'attenzione