

Persone con problemi di masticazione* Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche Indagine PASSI d'Argento 2012-2013 (n= 24.129) Pool di Asl: 14,8% (IC95% 14,2 – 15,5)

*** Persone con 65 anni e più che dichiarano di masticare male (con l'esclusione di coloro che masticano bene solo se usano la dentiera).**

Pazienti NON gravi, N= 3068

Liv. SE	%	OR grezzo	OR agg*	95% IC	
Alto	5,3	1,00	1,00		
II	6,6	1,25	1,19	0,65	- 2,15
III	5,5	1,03	1,06	0,58	- 1,91
IV	7,0	1,33	1,33	0,77	- 2,30
V - basso	9,3	1,82	1,92	1,15	- 3,20

p trend = 0.0101


Pazienti gravi, N= 541

Liv. SE	%	OR grezzo	OR agg*	95% IC	
Alto	23,8	1,00	1,00		
II	28,9	1,30	1,34	0,63	- 2,87
III	28,4	1,27	1,28	0,60	- 2,75
IV	26,2	1,14	1,01	0,49	- 2,08
V - basso	24,3	1,03	1,01	0,51	- 2,00

p trend = 0.551


* OR aggiustato per età, genere, gravità, comorbidità

Tutti i pazienti, N= 3609



Prevalenza d'uso di xantine e Odds Ratio (OR) per livello socio-economico tra i pazienti con BPCO, età 45-65 anni. Roma 2005-2009

Fonte: Bauleo et al 2011



Effetto del programma di screening mammografico ad inviti in Emilia-Romagna: percentuale di stadi avanzati alla diagnosi e di sopravvivenza a 5 anni, per livello d'istruzione e periodo di calendario, nelle donne di 50-69 anni.